

Reviscon
Sodium Hyaluronate

Smertelindrende
behandling for økt
funksjonalitet

 **VSY**
BIOTECHNOLOGY

Reviscon Reviscon Plus
Reviscon Mono

PRODUKTLINJE FOR
INTRAARTIKULÆR INJEKSJON



Innhold

Hva er osteoartritt?

Symptomer på osteoartritt

Årsaker til osteoartritt

Hva er et synovialledd?

Hva er hyaluronsyre (HA)?

Behandling av osteoartritt - Reviscon-produktlinjen


Hvordan brukes Reviscon-produktlinjen?

Hva er fordelene ved Reviscon-produktlinjen?

Indikasjon på Reviscon-produktlinjen

Reviscon
Sodium Hyaluronate

PRODUKTLINJE FOR
INTRAARTIKULÆR INJEKSJON



Reviscon-produkter inneholder NaHA med høy molekylærvekt som brukes til å lindre smerte og stivhet, og forbedre nedsatt eller begrenset bevegelse i alle synovialledd forårsaket av osteoartritt.

Reviscon
Sodium Hyaluronate

PRODUKTLINJE FOR
INTRAARTIKULÆR INJEKSJON



Hva er osteoartritt (OA)?

Osteoartritt (OA) er en degenerativ, ikke-inflammatorisk og progressiv leddsykdom som kjennetegnes ved ødeleggelse av brusk og synovial betennelse. Det er den vanligste formen for artritt som generelt rammer den eldre befolkningen over hele verden. Bruk er et fast, men elastisk materiale som dekker benenes overflate i leddene. Brusken fungerer som en pute for å absorbere støt som genereres når benene beveger seg. Ved osteoartritt blir brusken stiv og slites ned over tid. Det forårsaker at sener og ligamenter strekkes og at ben gnis mot hverandre. Dette resulterer i ekstrem smerte, især i leddene, og fører til tap av bevegelse. Selv om osteoartritt kan skade hvilket som helst ledd, påvirker lidelsen oftest ledd i hender, knær, hofter og ryggrad.

Symptomer på osteoartritt

- Symptomene på osteoartritt utvikler seg ofte sakte og forverres over tid.
- Tegn og symptomer på osteoartritt inkluderer:
Smerter i et ledd ved eller etter bruk, eller etter en periode med inaktivitet
- Ømhet i et ledd når lett trykk påføres
- Stivhet og begrenset bevegelse i et ledd, vanligvis merkes det om morgenen når man våkner eller etter en periode med inaktivitet
- Tap av fleksibilitet og vanskeligheter med å bruke et ledd
- Hevelse, i noen tilfeller
- Knirkelyd når et ledd bøyes

Årsaker til osteoartritt




De vanligste faktorene som bidrar til utvikling av osteoartritt er oppført nedenfor: **Aldring** - Slitasjegikt begynner etter fylte 45, og det er en svært vanlig tilstand hos personer over 65 år. **Genetiske faktorer** - Ulike genetiske egenskaper kan predisponere en person til å utvikle slitasjegikt. **Overvekt** - Overvektige individer er mer utsatt for å utvikle osteoartritt siden vekten legger ekstra press på hofter og knær. **Leddskaade** - Osteoartritt kan noen ganger utvikle seg etter en traumatisk ledsskade. **Yrke** - Visse yrker som krever at man står i lange perioder, gjentatte bøyninger, tunge løft eller andre bevegelser kan også føre til slitasje på brusk og forårsake osteoartritt. **Kjønn** - Osteoartritt er mer vanlig hos menn yngre enn 50, etter 50 er det mer vanlig hos kvinner. Kvinner opplever også raskere utvikling av hofteleddsartrose enn menn.

Hva er et synovialledd?

Et synovialledd er den vanligste typen led i menneskekroppen som forbinder to bevegelige ben. Ledd har en ytre leddkapsel som holder benene sammen og en indre synovialmembran som inneholder leddvæsken.


Virkestoffet i synovialvæsken er hyaluronsyre som fungerer som en støtdempende pute og smøremiddel for å redusere friksjon mellom leddbrusken i synovialledd under bevegelse.



Hva er hyaluronsyre (HA)?

Hyaluronsyre, også kjent som hyaluronan, er et naturlig stoff som produseres av kroppen. Det er hovedstoffet i synovialvæsken og fungerer som en støtdempende pute og et smøremiddel i leddene.

Ledd er som tannhjul, så de må smøres godt. Ved osteoartritt, mister hyaluronsyren sine nødvendige egenskaper i synovialvæsken. Dette tapet av hyaluronsyren bidrar til leddsmerter under bevegelse og stivhet.



Behandling av osteoartritt - Reviscon-produktlinjen

Alle Reviscon-produkter er intraartikulære injeksjoner som inneholder natriumhyaluronat med høy molekylærvekt for å forhindre smerte og redusere bevegelseshemninger forårsaket av osteoartritt for samtlige ledd.

Reviscon 20 mg



Reviscon Plus 32 mg



Reviscon Mono 48 mg



Reviscon
Sodium Hyaluronate

Reviscon-produkter er biokompatible og kun utformet for intraartikulær bruk. Hyaluronsyren som brukes er ikke av animalsk opprinnelse.



Hvordan brukes Reviscon-produktlinjen?

Kun helsepersonell bør bruke alle Reviscon-produkter.

Reviscon-produkter injiseres i kneet og de andre leddene av legen din. Det tar bare noen få minutter å fullføre injeksjonen. Du kan forlate legekontoret umiddelbart etter injeksjonen. Du bør unngå aktiviteter som legger tungt press på injeksjonsstedet i opptil 48 timer etter injeksjonen. Det finnes tre former for Reviscon. Legen din kommer til å anbefale en dose som er hensiktsmessig for sykdommen din.

- **Reviscon Mono** er et injeksjonsprodukt til engangsbruk. Etter injeksjonen varer effekten i minst seks måneder.
- **Reviscon Plus** injiseres 1-3 ganger med intervaller på 5-10 dager, og effekten varer i 6 måneder.
- **Reviscon** injiseres 3-5 ganger med intervaller på 5-10 dager, og effekten varer i 6 måneder.



Hva er fordelene ved Reviscon-produktlinjen?

Reviscon, Reviscon Plus og Reviscon Mono er intraartikulære injeksjoner som inneholder hyaluronsyreløsning. De har følgende virkninger:

Får deg til å føle deg komfortabel når du beveger deg.

Reduserer smerte og stivhet i opptil seks måneder.

Hjelper kroppen med å produsere sunn synovialvæske.

Reduserer betennelse i leddene.

Gir høye støtdempende egenskaper med det høye molekulære vekt innholdet av hyaluronsyre.





Reviscon Reviscon Plus
Reviscon Mono

PRODUKTLINJE FOR
INTRAARTIKULÆR INJEKSJON

Reviscon
Sodium Hyaluronate

Smertelindrende behandling for økt funksjonalitet

For mer informasjon besøk
du www.scp.no

SCP | ORTO
PEDI®

Kontakt: support@scp.no

 **VSY**
BIOTECHNOLOGY